

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部
普濟方卷三百五十二

詳校官太醫院醫士臣程泰

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣繆琪

校對官中書臣朱忻

謄錄監生臣伍士鵬

欽定四庫全書

普濟方卷三百五十二

明

周王朱橚撰

產後諸疾門

崩中漏下

附論

夫產後崩中漏下者蓋由產卧傷耗經脉未得平復而
勞役損動致血暴崩淋瀝不止或因醎酸不節傷露榮
衛氣血衰弱亦變崩中又有多因七氣所傷臟氣不平
或服斷血藥早致惡血不消主成崩中

方

側柏丸 治產後崩中久下血不止或赤或黑臍下疼痛

側柏

炙微黃

白芍藥

黃耆

剉

熟乾地黄

續斷

各一

兩

代赭

一兩半

牛角腮灰

禹餘糧

燒醋淬三偏

桑耳

當歸

剉微炒

艾葉

微炒各一兩

龜甲

二兩塗醋炙令微黃

右為末煉蜜搗三五百杵丸如小豆大每服空心以黃耆湯下三十丸

熟乾地黄散 治產後崩中頭目旋暈神思昏迷四肢

煩亂不知人事

熟乾地黄 伏龍肝 黃耆 赤石脂 阿膠

各一兩

甘草 白朮 艾葉 川芎 人參

各半兩

當歸

三分

右咬咀每服三錢薑三片水一大盞煎至七分去滓

溫服

阿膠丸 治產後崩中下血不止虛羸無力

阿膠 赤石脂各半兩 續斷 川芎 當歸 甘草

丹參

各一兩

龍骨

鹿茸

酥炙

烏賊骨

龜甲

炙各三兩

右為細末煉蜜為丸如梧桐子大空心溫酒下二三

十丸一方加鱉甲一兩

白芍藥散 治產後崩中下血淋瀝不絕黃瘦虛損

白芍藥 牡蠣 乾薑 熟乾地黄 桂心

黃耆 烏賊骨 鹿角膠 龍骨

各一兩

右為末食前溫酒調下二錢

療產後下血不止

桑耳

炙

芍藥

炙

地榆

葛根

牛角腮

阿膠

各六

分

艾葉

雞蘇

各四分

白龍骨

十分

右㕮咀以水二升煮取八合分三服 此藥尤能治

產後痢先以桂九小下之次投硃砂九日九十九利

頓減半次日遂愈硃砂九產後雖無疾亦宜服之能

養血氣去積滯

大黃散 治崩漏下血不止

大黃

三兩

芒硝

一兩

桃仁

水蛭

虻蟲

各三十枚

甘草

當歸

各三兩

蟪蟲

四十枚

右咬咀以水三升酒二升合煎取三升去滓分三服

龍骨散

療崩中下血

龍骨

研

赤石脂

研各六分

烏賊魚骨

牡蠣粉

肉蓯蓉

各五兩

龜甲

炙

芍藥

右搗散飲服方寸七日三漸加之加乾地黃十分佳

龜甲散

治產後崩中下血過多不止

龜甲

三兩醋浸
炙令微黃

黑桑耳

二兩

鹿茸

一兩

去毛塗
酥炙令黃

白石脂

一兩

禹餘糧

一兩

燒醋
滓三兩

當歸

一兩

剉
微炒

吳茱萸

半兩

湯浸
炒令微黃

芎藭

一兩

栢子仁

一兩

右為散每於食前以溫酒調下一錢

瑞蓮散

治產後惡血崩漏狀如泉水

瑞蓮

百枚
燒存性

棕櫚

燒存

當歸

桂心

各一

兩

鯉魚鱗

燒

川芎

各三

檳榔

三枚

右為細末每服三錢煨薑酒調下未止更盡即止

桂九

硃砂 桂心 甘遂 丁香 木香

芫花

以硃砂炒焦
已上各等分

巴豆

去心皮不
去油減半

右為細末麪糊丸如菉豆大每服二丸三丸溫酒下

加減更量虛實此丸最宜取積不以久近皆能消化

阿膠散

出聖
惠方

治產後崩中下血不止作血片如雞肝色

碎爛者

阿膠

一兩搗碎
炒黃燥

當歸

一兩對
微炒

續斷

一地榆
一兩對

熟乾地黄

一兩

牛膝

一兩

紅花子

一兩

右為散每服三錢以伏龍肝一兩浸取水一中盞煎

至六分去滓每於食前溫服

騏驎竭散

出聖惠方

治產後崩中下血不絕小腹痛

騏驎竭

一兩

禹餘糧

一兩

燒醋

地榆

一兩

阿膠

二兩搗碎炒令黃色

赤芍藥

一兩

熟乾地黄

一兩

右為散每於食前以溫酒調下一錢

熟地黄散

出聖惠方

治產後崩中下血淋瀝不絕黃瘦虛損

熟地黃

赤石脂

各一兩

鹿茸

牡蠣

當歸

各半兩

右為細末食前粥飲調二錢

固經丸

出醫方集成

治產後所下過多勞役傷損致血暴崩

淋瀝不已或醎酸不節所致此謂重傷如有腹脹則是瘀血使然此藥又非其治

艾葉

赤石脂

煨

補骨脂

木賊

各半兩

附子

一箇炮

右為末陳米湯和丸如梧桐子大食前溫酒下二十丸米飲亦可一方煎芎歸湯加芍藥下評曰血崩不

是輕病况產後有此是謂重傷恐不止酸酸不節而致多因驚憂怒氣不平或產後服斷血藥太早致惡血不消鬱滿作堅亦成崩中固經丸自難責効不若大料煮芎藭湯加芍藥候定隨證藥治為得小腹滿痛肝經已壞難治局方大順散除杏仁用醋煮附子依等分入効

桂心散

出千金方

治崩漏下血不止

桂心

薺曹

各二兩

枯萎根

牡丹

各三兩

豉

一升

右咬咀以水八升煎取三升去滓分三服

治產後血崩不止

出護命方

兔絲子

杜仲

去皮

益智子

去皮

草薢

山茱萸

茯苓

五味子

赤石脂

龍骨

川芎

各一分

川椒

三銖

覆盆子

半兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大早朝空心鹽湯下三

十丸

治產後崩中惡露不止大脘冷方喫此方

出護命方

白朮 當歸 芍

白芷

各半兩

牡蠣

火燉三分

舶上硫黃

一兩細研

右為細末令如飛塵同舶上硫黃相裒鍊蜜丸如梧桐子大早朝空心鹽湯下三十丸

伏龍肝散 療崩中下血數升氣欲絕

伏龍肝

五升

人參

一兩

麝香

二兩

生薑

四兩

右切以水一大斗煮土取二升下藥煎取一升半更別研伏龍肝一雞子許并麝香內湯中攪令調分服

治產後連下血不止者

黃連

黃蘗

阿膠

炙各三分

熟艾

二兩

右以水六升煮取二升半分溫為三服

龍骨丸

治產後虛冷下血及所下晝夜無數兼治產

後惡露不斷

方見本門產後惡露不絕類龍骨丸

加味芎藭湯

出醫學類証

芎藭

當歸

芍藥

各等分

右咬咀每服四錢水一盞半煮取七分去滓無時熱

服

治產後崩露下血不止

出朱氏
集驗方

棕櫚皮

乾薑

烏梅

各一兩燒
灰存性

右研為細末每服三錢煎烏梅湯調下不拘時候久

患三服愈

香墨散

出聖
惠方

治產後崩中下血不止

香墨

半兩

露蜂房

半兩
微炒

龍骨

半兩

右為散每於食前用水煎乾地黃湯調下二錢

又方

出聖惠方

白堊

半兩

乳香

一分

阿膠

半兩

搗碎

炒令黃燥

右為散每於食前以粥飲調下一錢

赤龍皮散

出聖惠方

治產後崩中有惡物或渴者

赤鯉魚皮

二兩

亂髮

一兩

機櫚皮

一兩

剉

右同於銚子內用麻點火均炒令煙盡候冷入麝香

半分研令勻每於食前以醋一合水二合煎一兩沸

調一錢服之

蚕退散

出海上
名方

治崩露下血不止

蚕退紙

棕櫚皮

各燒灰
存性

右研為末每服各抄二錢溫酒調下立効

又方

出十
金方

治產後漏血不止

露蜂房

敗船茹

右等分燒作灰取酲若漿服方寸匕日三

又方

出聖
惠方

艾葉

一握
微炒

伏龍肝

一雞
子大

右相和以酒一大盞煎至六分去滓食前分溫二服

又方

出聖惠方

牡蠣

一兩燒為粉

兔骨

一兩塗醋炙微黃

右為散每於食前以溫酒調下二錢

地黃酒方

出聖惠方

治產後崩中下血不止心神煩亂

生地黃汁

半小盞

益母草汁

半小盞

右酒一小盞相和煎三五沸分為三服頻頻服之効

治產後崩中不止方

出聖惠方

荷葉

一兩七月七日採

鹿角膠

二兩搗碎炒令黃燥

右為散每於食前以溫酒調下二錢

菖蒲酒

出聖惠方

治產後崩中下血不止

用菖蒲一兩半細剉以酒二錢煎至一盞去滓溫服

分作三服食前

夏枯草散

出海上名方

治崩中漏下血不止

用夏枯草燒灰研為末每服二錢溫米飲調下

桃枝散 療崩中下血不止并男子卒痢血

取東南引桃枝三握細切以水四升煮取一升頓服
未瘥更服良

治產後血不止

用竈黑煤以熱酒調送下便瘥

又方

出聖
惠方

用刺薊半斤淨洗曝乾以酒五升浸經三宿每日隨
意多少煖服之

白芷丸

出千金方

治產後所下過多及崩中傷損虛竭少氣

面目脫色腹中痛方

白芷

五兩

乾地黃

四兩

續斷

乾薑

當歸

阿膠

各三兩

附子

一兩

右七味為末蜜和丸如梧桐子大酒服二十九日四

五服無當歸芎藭代入蒲黃一兩炒續斷大蘇根代

秘方龍骨丸

出危氏方

治半產後及下虛數月崩漏不止

白牡蠣

北赤石脂

代赭石

已上并假

白龍骨

伏龍肝

海螵蛸

五靈脂

側柏葉

各等分

棕櫚

不拘多少燒反

真蒲黃

多加入

右為末醋糊丸如梧桐子大每服三十五丸以十全大補湯三錢加嫩鹿茸去毛酒炙阿膠蛤粉炒各一錢半薑三片棗二枚烏梅二箇煎吞服立効

大聖散

朱氏集驗方

治小產下崩不止忽大渴飲水則吐藥

食不進命在須臾一醫用後藥一服吐住

荆芥末半錢合大聖散用白湯點服

治女人產後漏下及痔病下血方

礬石 一 附子 一

兩枚

右為末蜜丸如梧桐子大空心酒下二九日三稍加至五九數日瘥能百日服之永斷

治崩中單方

出千金方

用牛角末以酒服方寸匕日三服亦治帶下

月水不通 附論

夫產傷動於血氣其後虛損未復而為風冷所傷血之為性得冷則凝結故風冷傷經血結於胞絡之間致令

月水不通也凡血結月候不通則變成血瘕水血相併復遇脾胃衰弱肌皮虛者則為水腫也

方

大黃丸 治產後惡血凝滯月水不通

川大黃

一兩剉微炒

桃仁

一兩湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

乾漆

一兩搗碎

炒令烟出

赤茯苓

三分

甜葶藶

三分隔紙炒令紫色

牛膝

一兩去苗

牡丹

三分水蛭

半兩炒令黃

芎藭

半兩

桂心

半兩

柴胡

三分去苗

牡蒙

三分

人參

半兩去蘆頭

當歸

半兩剉微炒

黃蟲

半兩微炒令黃去翅足

川椒

半兩去目及閉
口者微炒去汗
吳茱萸 一分湯浸七
乾薑 一分炮裂剉

麝蟲 半兩炒
令微黃生乾地黃 一兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服食前以溫酒下二

十九

益母草子散 出聖
惠方 治產後惡血積留經久未消致月水

不通面色萎黃臍腹疼痛肌瘦無力

益母草子 一兩
桂心 半兩
當歸 三分
熟乾地黃 半兩

大麥蘖 半兩
微炒赤芍藥 半兩
鬼箭羽 半兩
紅藍花 半兩

川大黃

三分

赤鯉魚皮

兩 灰半

亂髮灰

兩 半

密佗僧

兩 半 燒醋

過 滓 蟲

一兩 去翅 足微炒

水蛭

二兩 炒 令黃

麝香

一分 研入

右為散以赤馬尿半中蓋酒半中蓋拌和前藥令勻

直候乾研入麝香每服食前以溫酒調下二錢

蟲蟲散

出聖惠方

治產後日久月水不通

蟲蟲

半兩 去翅 足微炒

川大黃

三分 剉 微炒

亂髮灰

兩 半

蒲黃

兩 半

騏驎竭

兩 半

延胡索

三分

伏龍肝

半兩 細研

當歸

兩 半 剉 微炒

赤芍藥

兩 半

狗膽

二枚 乾者

麝蟲

半兩 微炒

水蛭

半兩 令黃

麝香

兩 半 炒

一分
研入硃砂半兩細研
水飛過

右為細散入研了藥令勻每服食前以溫酒調下二

錢

虎杖散

出聖惠方

治產後多時月水不通

虎杖

三分

牛膝

三分
去苗

蘇枋

半兩
對

紅藍花

半兩

連子心

半兩

當歸

三分
對
微炒

桂心

半兩
兩

牡丹

半兩
兩

乾漆

半兩
今烟出

鬼箭羽

半兩

狗膽

二枚
乾者

硃砂

半兩
研入

琥珀

半兩
兩

麝香

一分
研入

右為散入研了藥令勻每服食前溫酒調下二錢

琥珀散

出聖惠方

治產後月水不通腹脇妨悶四體煩疼飲

食減少漸覺虛困

琥珀

一兩

虎杖

三分

牛膝

一兩

木香

半兩

鱉甲

一兩

塗醋

炙微黃去

去

裙襪

赤芍藥

一兩

柴胡

一兩

赤茯苓

三分

桂心

半兩

桃仁

三分

湯浸去皮尖

雙仁麴炒黃川

大黃

一兩

碎微炒

當歸

三分

對

枳殼

三分

炒

枳殼

三分

炒

枳殼

三分

炒

枳殼

三分

炒

枳殼

三分

麴炒微黃去瓢

黃去瓢

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓食前溫服忌生冷油膩芻菜

牛膝散

出聖惠方

治產後氣滯月水不通腹脇疼痛

牛膝

一兩去苗

桂心

半兩

當歸

半兩剉微炒

菴藷子

一兩

牡丹

半兩

蓬莪茂

半兩

蘼麥

半兩

琥珀

半兩

防葵

半兩

劉寄奴

半兩

桃仁

半兩

半兩湯浸去皮尖
雙人麴炒微黃

甘草

半兩炒微赤剉

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓食前稍熱服

紅藍花

出聖惠方

治產後月水不通腹脇刺痛面色萎黃時

發煩熱不思飲食

紅藍花

兩半

琥珀

兩一

川大黃

一兩

剉微炒

蓬麥

兩半

當歸

兩一

剉微炒

桂心

兩一

延胡索

三分

赤芍藥

兩半

薑黃

兩半

牛膝

兩半

去苗桃仁

三分

湯浸去皮尖

雙人麤炒微黃

蓬莪茂

兩半

右為散每服一錢食前以溫酒調下

牡丹丸

出聖惠方

治產後月水不通脇腹滯悶四肢煩疼

牡丹

兩一

川大黃

一兩

碎微炒

赤芍藥

兩一

木香

兩半

桃仁

兩半

湯浸去皮尖雙仁麤炒微黃

蜜蟲

一分

微炒令

水蛭

一分

微炒令

黃

蟬蛻

蓬麥

三分

芎藭

三分

當歸

三分

剉微炒

海藻

三分

洗鹹味

桂心

半兩

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大每服食前以溫酒

送下二十丸

鬼箭羽散

出聖惠方

治產後月水不通腸腹時痛四肢煩疼

不欲飲食漸覺瘦弱

鬼箭羽

一兩

川大黃

一兩剉碎微炒

木香

半兩

當歸

三分剉微炒

桂心

三分

桃仁

三分湯浸去皮尖雙仁麩炒黃

赤芍藥

三分

牛膝

一兩去苗

鱉甲

一兩醋塗炙令黃去裙襖

延胡索

三分

益母草

半兩

右為散每服三錢水一中盞入生薑半分煎至六分

去滓食前服

蟪螬丸

出聖惠方

治產後月水不通

蟪螬

半兩微炒

蛭蟲

半兩去翅足微炒

水蛭

半兩炒令黃

桑螵蛸

半兩

微炒

狗膽

二枚乾者

代赭

半兩

川大黃

一兩剉微炒

桃仁

一兩湯浸去皮

尖雙人麤炒微黃

右為末煉蜜和丸如梧桐子大每服空心溫酒送下

十九

赤龍皮散

出聖惠方

治產後滯血在臍致月水不通

赤鯉魚皮

四兩燒灰

蜜蟲

一分微炒黃去翅足

水蛭

一分微炒黃

蒲黃

半兩

琥珀

半兩

亂髮灰

半兩

麝香

一錢細研

右細研每服食前熱酒調下一錢

硃砂丸

出聖惠方

治產後月水經久不通

硃砂

半兩細研

桂心

半兩

燕脂

一錢研入

班貓

半兩去翅足以糯米拌炒米黃為度

右為末入研了藥令勻以狗膽和丸如梧桐子大每

服空心以紅花酒送下三九加至五九覺臍腹痛即

頻服桃仁湯亦通

菴蘭子酒

出聖惠方

治產後風冷留血不去停結月水閉塞

菴蘭子

一斤

桃仁

二斤湯浸去皮尖雙人麤炒

大麻人

一斤

右用好酒三斗同入黃瓷中密封頭以糠火養半日

久每日空心溫飲一中盞午時食前再服

虎杖煎

出聖惠方

治產後月水不通

虎杖

一斤剉

土瓜根汁

半升

牛膝汁

半升

右以水五升漬虎杖一宿明旦煎至一升內二味汁

攪勻令入銅器中熬如飴食前以溫酒調下一合

又方

出聖惠方

治產後月水往來乍多乍少仍復不通時時

疼痛小腹裏急下引腰身重

用鹿角末服以溫酒調下三錢

又方

出聖惠方

用生地黃汁三升煮取二升服之一方酒煎

又方

出聖惠方

用飲人乳汁三合

月水不調

附論

夫產後月水不調者由產後動血氣虛損未復而風邪冷熱之氣客於經絡乍冷乍熱冷則血結熱則血消故令月水或多或少或在月前或在月後故名不調也

夫婦人衝任之脉為經絡之海皆起於胞內而手太陽小腸之經手少陰心之經也此二經上為乳汁下為月水若產後月水不通者蓋新產之後勞傷氣血或去血過多乳汁通行自是不通若乳子歲半或一歲之內而

月經不行此是常候即非病也何必通之諺云妳假是也若歲半而行者或四五箇月更經行者皆是少壯血盛之人注受極易產乳必衆其子失乳必四肢尪羸肚大青筋頭大髮焦好啖泥土病名無事若經血有餘者不可以藥止之若產後一二歲月經不通而無疾苦何必服藥或勞傷氣血衰少而不能行者但服健脾胃資氣血藥自然通行若以牛膝紅花蘇木乾漆蚩蟲水蛭等藥以通之則為害滋大經水枯竭則無以滋養其能

行乎初虞世所謂譬猶索萬金於乞丐之手雖捶楚並下而不可得也後之學者更宜詳審而療之

方

牛膝丸

出聖惠方

治產後月水不調小腹痞硬乍寒乍熱食

不生肌心腹刺痛口乾多唾手足沉重

牛膝

一兩去苗

赤芍藥

三分

甘草

三分微炙赤剉

鬼羽箭

三分

人參

三分去蘆頭

當歸

一兩剉微炒

白朮

一兩剉

牡丹

一兩

虎杖

一兩

烏梅肉

半兩微炒

白薇

半兩

川大黃

一兩剉碎微炒

蜚蠊

一分去翅

足微炒

水蛭

一分微炒今黃

蒲黃

半兩

熟乾地黄

一兩

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每服二

十丸食前溫酒下

牛膝丸

出聖惠方

治產後月水往來乍多乍少仍復不通時

時疼痛小腹裏急下引腰身重

牛膝

芍藥

人參

各三分

大黃

牡丹皮

甘草

當歸

芫薺

各三分

桂心

一兩

麝香

蟾蜍

蜚蠊

各四枚

蜚蠊

水蛭

各七枚

右為末蜜丸如梧桐子大酒服五九日三不知稍增

薑黃丸

出聖惠方

治產後虛乏不足胸心短氣腹內緊急腰

背疼痛月水不調食少煩渴四肢無力

薑黃

當歸

熟地黃

牡丹皮

厚朴

桂心

川芎

續斷

桃仁

白朮

赤芍藥

木香

各三分

羚羊角屑

一分

右為細末煉蜜和丸如梧桐子大食前溫酒下三十

丸

牡丹散

出聖惠方

治產後月水不調臍腹疼痛

牡丹

三分

木香

半兩

肉桂

半兩

當歸

三分

赤芍藥

三分

延胡索

三分

蓬莪茂

半兩

虎杖

三分

甘草

半兩

琥珀

三分

生乾地黄

一兩

鱉甲

一兩

醋炙

微黃去裙襴

芎藭

半兩

右為散每服三分水一中盞半煎至五分去滓食

前稍熱服

養蘭子丸

出聖惠方

治產後月候不調或生寒熱羸瘦飲食

無味漸成勞證

菴蘭子

兩半

白薇

兩半

桂心

分三

防葵

兩半

桃仁

兩半

去皮尖雙

湯浸

人麝炒

微黃

鬼箭羽

分三

乾薑

兩半

裂剉

牛膝

一兩

去苗

當歸

兩半

剉微炒

熟乾地黄

分三

芎藭

兩半

鱉甲

一兩

塗醋炙

黃去酒

潤

右為末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服二十

丸食前溫酒下

桑耳散

出聖惠方

治產後經絡不調臍腹下疼痛

桑耳

分三

菴蘭子

兩半

牛膝

一兩

去苗

赤芍藥

分三

白茯苓

一兩

兩

延胡索

兩一

桂心

分三

芎藭

兩一

澤蘭

分三

生乾地黄

一兩

兩

右為散每服二錢食前溫酒調下

紫桂散

出聖惠方

治產後雖久體力尚虛月候不調或多或少

少臍腹疼痛面色痿黃

肉桂

一兩半
去皮

延胡索

三分

熟乾地黄

二分

當歸

半兩
剉微炒

沒藥

半兩

菴藺子

二分

牛膝

半兩
去苗

乾漆

半兩
搗碎
炒令煙出

琥珀

半兩

騏驎竭

半兩

右為散每服二錢食前溫酒調下

琥珀散

出聖惠方

治產後經脉不調四肢煩疼飲食全少日

漸羸瘦

琥珀

牛膝

生乾地黄

當歸

各一兩

桃仁

赤芍藥

各半兩

右為粗末每服三錢水一盞生薑三片煎至六分去

滓溫服一方加桂心半兩

梔子湯

治產後月水不調及腹中塊不除身強痛方

芍藥

四兩

牡丹

蜚蠊

各三兩

梔子

十四枚

右用水五升煮取二升分為三服

桃仁湯

出聖惠方

治產後及墮身月水不調或淋瀝不斷斷後

復來狀如瀉水四體虛乏不能飲食腹中堅痛不可行
動月水或前或後或經月不來舉體沉重惟欲眠卧
多思醋物

桃仁

五十枚

澤蘭

甘草

芎藭

人參

各二兩

牛膝

桂心

牡丹皮

當歸

各三兩

芍藥

生薑

半夏

各四兩

地黃

八兩

蒲黃

七合

右咬咀以水二斗煮取六升半分六服

黃良丸

出聖惠方

治產後經脉不調勻者是因傷動血候不

定凡婦人室女經水不調宜服之

細辛

去苗

大黃

醋煮為膏

當歸

酒浸去蘆

桃仁

酒浸去尖

川芎

不見火

牛膝

洗去蘆頭酒浸一宿乾用如急要用酒蒸過為好

右為細末大黃膏為丸如梧桐子大每服三十丸空

心溫酒下

血瘕

附論

夫新產後有血與氣相搏而痛者謂之瘕瘕之言假也

謂其痛浮假無定處也此由宿有風冷血氣不治至血下則少故致此病也不急治則多成積結妨害月水輕則否澁重則不通也 又云妊娠聚血產後氣羸惡露未盡新血相搏而痛俗謂之兜枕乃血瘕也

方

凌霄花散 治血瘕血塊及產後惡露不盡并積聚疼痛漸成勞瘦悉皆治之

凌霄花

分

牡丹皮

山梔子

赤芍藥

紫荷車

血竭

沒藥

硃砂

地骨皮

五加皮

甘草

各二分

紅娘子

十箇 桃仁

紅花

桂心

延胡索

當歸

各二兩

右為細末溫酒調一錢服

乾漆丸

出聖惠方

治產後血瘀堅聚按之躍手食飲不為肌

膚面色萎黃不耐勞動嘔逆上氣月水不通一切百

病悉皆治之

乾漆

二兩搗碎炒出煙

川大黃

二兩剉碎微炒

栢子仁

一兩牛膝一兩去苗

人參

一兩去蘆頭

牡丹

一兩

生乾地黃

一兩

麝蟲

四十枚微炒

赤芍藥

一兩

桂心

一兩

蟾蜍

四十枚
微炒

當歸

一兩半
剉微炒

乾薑

一兩
炮裂剉

麝香

一分
研入

蜜蟲

四十枚
去翅足微炒

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如梧桐子大每日空

心以熱酒下十丸

菴蘭子丸

出聖惠方

治產後餘血不盡結成血瘕月水不利

四肢羸瘦不欲飲食

菴蘭子

一兩

川烏頭

三分
炮裂去皮臍

桂心

三分

防葵

半兩

桃仁

一兩湯浸去皮
去雙人麴炒黃

吳茱萸

半兩湯浸七
次焙乾微炒

乾薑

半兩
炮裂剉

牛膝

一兩
去苗

赤芍藥

半兩

芫花

三分
醋拌
炒令乾

川大黃

一兩
剉碎
微炒

當歸

一兩
剉微炒

生乾地黃

一兩

芎藭

一兩

鱉甲

一兩
塗醋炙
微黃去裙襴

右為末煉蜜和搗三五百杵丸如梧桐子大每食前

溫酒下二十九

琥珀散

出聖
惠方

治產後臟腑風有風冷惡血下少結積成

血瘕致月水不利

琥珀

半兩
細研

硫黃

半兩
細研

白石英

一兩

沒藥

半兩

麒麟竭

半兩

斑猫

一箇
去翅足
炒熱

水蛭

半兩
炒黃

乾漆

半兩
炒出烟
搗碎

海馬子

九枚

桂心一兩 當歸一兩 刺繭一分 芫花一兩 醋

麝香

一分 研入

右為散入研藥令勻每服一錢以酒半盞童便半盞

桃仁七枚去皮尖研同煎一兩沸每日空心服當下

惡滯物以瘥為度

鱉甲丸

出聖惠方

治產後惡露不盡結成血瘕乍寒乍熱心

腹脹痛不欲飲食四肢羸瘦或時口乾

當歸 木香 赤芍藥

各半兩

鱉甲 一大黃

一兩 炒

牛膝 白朮 水蛭製 蜜蟲製各一分 牡丹皮

桂心各三分 鬼箭羽半兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大桃仁湯吞下二十九

食前服更宜加減不可連併服

肉桂散

出聖惠方

治產後惡血不盡結聚為血瘕腹中堅滿

不下飲食

肉桂

一兩去皮

當歸

半兩剉微炒

蒲黃

半兩

牛膝

三分去苗

鬼箭羽

三分

蜜蟲

半兩去翅足微炒

琥珀

三分

桃仁

三分湯浸去皮尖雙仁麩炒微黃

赤芍藥

三分

水蛭

半兩炒令黃

川大黃

一兩剉微炒

右為散每服食前以酒調下一錢

騏驎竭丸

出聖惠方

治產後惡血不散結成血瘕在臍左右

攻刺疼痛月候不通

騏驎竭

一兩

川大黃

一兩剉微炒

硃砂

一兩細研

乾漆

一兩搗碎炒令微煙

沒藥

一兩

班貓

一分去翅足微炒

穿山甲

一兩炙黃

芫花

一兩醋拌炒乾

桂心

一兩益母草

半兩

右為末以醋煮麪糊和搗三五百杵如豌豆大空心

以當歸酒下十九紅藍花酒下亦得服後良久取下

惡物立効

芫花煎丸

出聖惠方

治產後虛冷惡血不盡結成血瘕腹脇

疼痛

芫花

一兩末以好醋三升浸如膏

木香

半兩

附子

半兩炮裂去皮臍

琥珀

半兩

當歸

一兩剉微炒

桃仁

一兩湯浸去皮尖雙仁麤炒微黃

硃砂

一兩細研

乾漆

一兩搗碎炒出煙

京三稜

一兩微煨剉

右為末入前芫花煎相和更入蜜少許熬令稠候可

丸如梧桐子大每日空心以醋湯下五十丸兼治惡
血衝心神効

硃砂丸

出聖惠方

治產後腹中有血瘀疼痛

硃砂

半兩

乾漆

半兩

搗碎

炒令烟出

麝香

十四枚

去微炒

巴豆

十枚

去皮心炒斷烟

芫花

半兩

醋炙令黑

蜜蟲

十四枚

去翅足微炒

當歸

半兩

剉微炒

菴蘭子

半兩

剉微炒

右為末用醋煮麪糊和搗三二百杵丸如梧桐子大

每服以童便一小盞酒半盞相和煎至五分不計時

候下三丸

琥珀丸

出聖惠方

治產後積聚成血瘕致月水不通小腹疼

痛

琥珀

一兩
細研

沒藥

一兩

當歸

一兩
剉微炒

赤芍藥

一兩

京三稜

一兩

鱉甲

一兩
塗醋炙微黃

黃蟲

一兩
去翅足微炒黃

水蛭

一兩
炒令黃

右為末煉蜜和搗三二百杵丸如菉豆大每日空心

溫酒下十九

當歸散

出聖惠方

治產後腹內血瘕疼痛

當歸

一兩
剉微炒

赤芍藥

一兩
剉微炒

水蛭

一兩
剉微炒

黃蟲

一兩
去翅足微炒

小兒胎髮

一兩燒灰 瓷藥 一兩細研

芫花

一兩醋拌炒令黃

延胡索

一兩

右為散每日空心以溫酒調下一錢甚者不過五服

砒黃丸

出聖惠方

治產後血瘀結塊攻刺心腹疼痛

砒黃

半兩

芫花

一兩醋拌炒令黃

硃砂

半兩

香墨

一兩

奎煤

半兩

當歸

半兩剉微炒

乾漆

半兩搗碎炒令烟出

右為末以醋煮黑豆一兩取汁煮麴糊和丸如梧桐

子大每日空心以醋湯下七丸有惡血下瘥即住服

香墨丸

出聖惠方

治產後血瘀腹脇疼痛經脉不利

香墨

半兩

芫花

半兩醋拌炒乾

京三棱

一兩微煨剉

巴豆

一分去皮心研

紙裹壓去油

桃仁

半兩湯浸去皮尖雙人麤炒微黃

硃砂

半兩細研

狗膽

二枚乾者

右為末以醋一大碗熬候可丸即丸如菉豆大每服

食前溫酒下三丸

沒藥丸

出聖惠方

治產後血瘀結聚攻刺腹脇疼痛不可忍

沒藥

半兩

砒霜

半兩

硫黃

半兩細研

麒麟竭

半兩

硃砂

半兩細研

硃砂

半兩

右細研為末以糯米飯和搗三二百杵丸如菰豆大

空心生薑湯下三丸

紅藍花散

出聖惠方

治產後血瘀積結為塊腹中疼痛虛脹

紅藍花

半兩 研砂一分 細研

桂心

半兩

蒼蘭子

半兩

生乾地黃

半兩

右為散每日空心以熱酒調下二錢相次至三服必

下惡物瘕後如產婦將息勿令動勞

生地黃煎丸

出聖惠方

治產後血氣不調腹中生瘕結而不

散痛無定處

童便

升

生地黄汁

升

生藕汁

升

生薑汁

升

右先煎前三味約三分減二次下薑汁慢火煎如稀

錫每取一合煖酒送下

地黃煎丸

一名萬病丸

治產後血氣不調腹中生瘕不散

生地黃

一十斤淨洗搗絞汁

乾漆

半斤搗碎炒烟出為末

生牛膝

五斤搗絞汁

右以二汁內銀石鍋中文武火煎熬如稀錫下乾漆

末攪令勻可丸即丸如梧桐子大每服食前以溫酒

下十九一方無牛膝用地黃三十斤乾漆一斤

地黃散 療血瘕

生乾地黃

一兩 烏賊骨 二兩

右為末空心溫酒調二匕服

治產後血瘕痛方

出千金方

以古鐵一斤秤鎚斧頭鐵杵亦得炭火上燒令赤內

酒五升中稍服之神妙

治產後血瘕痛方

肘後方

乾薑

一兩 烏賊魚骨 一兩

右搗篩酒服二七日二服

血塊攻築疼痛

附論

夫產後氣脉不和惡露不盡風冷留滯與正氣相繫故脇腹之間結聚塊痛蓋以新產之後臍腹空虛真氣怯弱寒氣血衰與惡血共相為害其痛苦物所築故名築痛也 產婦血塊築痛此候因產後趕血未盡所致世俗收生多就踏板趕血不思生產之時已坐草近地久矣產畢臍腑空虛又且近地趕血冷濕乘之風邪入之

使敗瘀凝為血塊是謂血母衝禁硬痛非乳香沒藥延
胡索五靈脂輩所能療也治法不換金正氣散加辣桂
川芎白芷蓬朮乾薑同煎乘熱入法醋連進兩服冷濕
風寒邪一散其塊自消散瘀皆從大小便而出凡新產
須就床上趕血下帳避風

方

烏鷄飲 治產後餘血不盡結聚成塊堅硬疼痛腹肋
脹滿

雌烏雞

一隻去毛羽爪肚

鱉甲

一兩醋炙令黃去裙襖

桂心

鬼箭

牛膝

去苗各一兩

桃仁

一兩湯浸去皮尖雙人麤炒微黃

當歸

一兩剉微炒

菴藺子

一兩甘草

微炒半兩

川大黃

三分剉碎醋拌炒乾

芒硝

半兩

吳茱萸

一分湯浸七次焙乾微炒

右除雞外粗搗篩和勻以水四升將雞全煮取汁以

瓷器澄令清每服二錢七雞清汁一盞煎至七分去

滓溫服不拘時

琥珀散

治產後血塊攻刺腹脇疼痛衝心煩悶

琥珀

細研如粉

鯉魚皮

燒灰

赤芍藥 薑黃 蒲黃 牡丹

去心

當歸

微炒

大黃

剉碎微炒

桂

去粗皮

蓬莪茂

煨

牛膝

去苗酒浸

焙各半兩

右為散每服一錢七溫酒調下空心夜卧各一

當歸湯 治產後血塊血氣攻衝心腹疼痛

當歸

焙切

乾漆

炒烟透

樓欄

燒灰

紅藍花

甘草

炙

鯉魚皮

燒灰

白芍藥

牡丹

去心

紫葳

各半兩

香墨

一分

芫花

醋浸半日炒

乾焦色一分

右粗搗篩每服三錢七葱白三寸生薑三片水酒共

一盞同煎至七分去滓稍熱服

牡丹散 治產後血氣血塊血露不盡攻築刺痛

牡丹

去心

芍藥

當歸

切桂去

漏蘆

去蘆頭

白芷

芎藭

五靈脂

炒

陳橘皮

湯浸去白微炒

紅藍花

乾漆

炒烟透各半兩

右為散每服二錢匕生薑溫酒調下

蓬莪茂散

治產後血塊攻築疼痛

蓬莪茂

煨熱

桂

去粗皮各半兩

乾漆

搗炒烟出半兩

吳茱萸

湯浸微炒一分

右為散每服二錢匕溫酒調服

絡石湯

治產後瘦損不能飲食腹中有血塊淋瀝不

盡赤白帶下天行心悶

用絡石煎汁服之亦浸酒服

絡石一名石龍藤

硃砂散

出聖惠方

治產後餘血不盡結成癥塊臍腹疔刺疼

痛

硃砂

一兩細研

芫花

半兩醋拌炒乾

水蛭

微炒

蜜蟲

去翅足微炒各半兩

琥珀

三分

桂心

半兩

沒藥

三分

乾漆

半兩

麝香

一分

右為細散拌和令勻每服一錢匕溫酒調下食前

蓬莪散

治產後血氣血塊血露不盡攻築疼痛

蓬莪朮

炮 裂

紫葳

微 炒

木香

炮

羌活

去 頭

細辛

去 葉

苗

當歸

切 焙

芎藭

各 一 兩

右為散每服三錢匕用溫酒調下日再服

琥珀散

出 王 氏 普 濟 方

治產後血氣不和臍腹塊硬疼痛

當歸

焙

川芎

廣茂

煨 各 一 兩

赤芍藥

二 兩

陳皮

半 兩

乾薑

炮 半 兩

右為細末每服二錢酒水各半盞同煎至六分

食前日進二服

薑黃散 治產後血氣血塊疔刺痛

薑黃

當歸

切炒

蒲黃

生乾地黄

焙

桂

去粗皮

各一兩

右為散每服三錢匕酒調下

紫葳湯 治產後血氣血塊攻臍腹痛

紫葳

當歸

切炒

木香

各一兩

沒藥

一分

牛膝

酒浸去

皮三分

右粗搗篩每服二錢匕水酒共一盞同煎至七分去

滓溫服服後未瘥再服

吳茱萸丸 治產後血氣疔痛血塊作梗

吳茱萸

微炒

木香

當歸

微炒各一兩

桃仁

去皮尖雙仁麩炒研半兩

硃砂

一分研

右搗羅三味為末入硃砂桃仁和勻煉蜜為丸如梧

桐子大每腹二十九檳榔湯下

芎藭散 治產後血塊攻築心腹痛痞

芎藭

當歸

炙焙令香剉

栢葉

炙黃各一兩

大黃

炮裂桂去粗皮一分半兩

右為散每服二錢匕煎當歸酒調下日三夜一

治產後腹中有血塊痛

用蘩萋亦名鷄腸草以酒炒絞取汁和童子小便服良久惡血出盡又曝乾為末以醋為丸每服三五十丸空心服下惡血或只以汁溫服亦佳

蒲黃散

出便產須知方

治產後腹中有塊上下時動痛不可忍

者此由產後氣羸惡露未盡新血與故血相搏而痛俗謂之兒枕乃血瘕也

用真蒲黃研米飲調服二錢如燥渴者新水調商陸散治產後血氣血塊時攻心腹疼痛不可忍

商陸

乾者

當歸

切炒各一分

紫葳

凌霄花是也

蒲黃

各一兩

右為散空腹溫酒調下二錢匕

治產後血塊腹痛

出醫方大戊

京芎

炒

川當歸

炒

乾地黄

洗

芍藥

已上各一兩

蒲黃

一分銚內隔紙炒赤

右同為細末每服三錢空心溫酒服一方加川芎半

兩

大烏金散

治婦人產後昏迷不省人事血塊疼痛惡

血不通

烏金石

鐵炭是
三兩

自然銅

金色者碎末
醋熬二兩

川當歸

焙各
一兩

川大黃

童子小便浸一
宿臘月陰乾

右為細末每服二錢煎紅花酒半盞童子小便半盞

同調下食前日進二服惺靜血行止服

生地黄飲 治產後虛冷惡血結塊不散

生地黄汁

半盞

生薑

一分
取汁

童子小便

半盞

右一處煎三四沸分作兩服溫服須臾再服惡血下

滯氣通立瘥未効再作服

薑黃散 治產後血塊攻衝心腹痛

薑黃

切焙
炒乾

蒲黃

微
炒

桂

去粗皮
各一兩

右為散每服二錢匕生地黃自然汁調下日三夜一
大黃甘遂湯 治婦人小腹滿如鼓脹狀小便微難而
不渴由產後為水與血并結在血室也

大黃

四兩
蒸

甘遂

乾
炒

阿膠

炒各
二兩

右剉散每服三錢水一盞煎至七分去滓溫服其血
當下

乾地黃散 治產後餘血不盡結塊上衝心煩腹痛

生乾地黃^焙 芎藭

右各等分搗羅為粗散每服三錢匕以酒水各半盞煎至八分去滓溫服食前日三

白石藥方 治產後血塊攻築心腹痛疴暈方

以阿息山白石藥研如乳法令至細入指以酒服半

棗許神驗亦治產後血不利研石麤後為瘡常用之

地黃散 治產後血氣血塊敗血不快攻築疼痛

生地黃

八兩

生薑

四兩

右細切同就銀石鍋內慢火炒令半乾取出同焙燥
搗羅為散每服二錢匕溫酒調下不拘時候服

虛羸

附論

夫產後血氣虛竭臟腑勞傷若人年齒少盛能節慎將
養滿月便得平復如產後多因血氣虛弱雖逾日月猶
常疲乏因飲食不節調適失宜為風冷邪氣所侵搏於
氣血流注於五臟六腑則令肌膚不榮容顏痿悴故曰

虛羸

方

補益紫石英九

治產後虛羸之弱宜服

紫石英

一兩細研
水飛過

白石英

一兩細研
水飛過

澤蘭

三分
木香
兩

附子

一兩蛇裂
去皮臍

熟乾地黄

一兩
芍藥
三分
栢子仁
三分

桂心

三分
防風

半兩
去蘆頭

牛膝

去苗
續斷

人參

去蘆頭

白茯苓

各三分

羌活

半兩

黃耆

三分

白朮

三分

當歸

三分
微炒

甘草

一分炙
微赤剉

白薇

三分

乾薑

半兩
剉

杜仲

三分
去節皮
微黃剉

川椒

半兩去目閉口
者微炒出汗

右為末入研了藥都研令勻煉蜜和搗五七百杵九
如梧桐子大每於空心及晚食前以溫酒下三十丸
卷栢丸 治產後虛羸不能飲食及風虛勞等

卷栢

一兩麥門冬半兩去
心焙

澤瀉

三分熟乾地黃

一兩牛膝一兩
去苗

人參

三分去
蘆頭

黃耆

三分
剉

丹參

三分白茯苓

三分當歸

半兩剉
微炒

芎藭

半兩防風半兩去
蘆頭

牡丹

半兩桂心半兩

五味子

半兩白朮
半兩

細辛

半兩赤石脂一兩

羗活

半兩薏苡仁

半兩續斷

半兩

右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服以
粥飲下三十九日三服

白朮散 治產後體虛羸弱不思飲食遠視無力起
不得

白朮

一兩

黃耆

一兩

五味子

半兩

石斛

去根一兩

防風

半兩

去

人參

三分去

酸棗仁

半兩

牛膝

半兩

木香

半兩

桂心

半兩

當歸

半兩

白茯苓

三分

熟乾地黄

一兩

羚羊角屑

半兩

附子

二分炮裂

甘草

一分炙

乾薑

半兩

芎藭

半兩

右為散每服四錢以水一中盞入棗二枚煎至六分
去滓溫服日三服

熟乾地黄九 治產後虛羸及一切飲疾並宜服

熟乾地黄

一兩

當歸

三分剉

防風

半兩去

草薢

一兩

黃耆

一兩

續斷

一兩

芎藭

三分

五味子

三分

白朮

三分

甘草

半兩炙

附子

一兩炮裂

白薇

細辛

桂心

人參

去蘆頭

栢子仁

白茯苓

各三分

右為末煉蜜和搗五七百杵丸如梧桐子大每服以

溫酒下三十九日三服

小澤蘭丸

治產後虛羸勞冷身體尪瘦

澤蘭

二兩
六銖

當歸

甘草

一兩十
八銖

芍藥

栢子人

防風

茯苓

各一
兩

白芷

蜀椒

葉本

細辛

白朮

桂心

蕪荑

人參

食茱萸

厚朴

各十
八銖

石膏

二
兩

右為末蜜和丸如梧桐子大酒服二十九日三服稍

加至四十九無疾者依此方春秋二時常服一劑甚

良有病虛羸黃瘦者服如前一方無茯苓石膏有芍

藥乾薑胡洽十五味無栢子人人參食茱萸除細辛
桂心生用外熬盡令變色為末蜜丸如彈子大內煖
酒中服之千金翼無茯苓食茱萸有乾薑一兩

澤蘭丸 治產後勞傷腑臟虛羸不復氣血不調肢體

瘦弱困乏少力面色萎黃心常驚悸多汗嗜卧飲食
不進產後百日內每日服壯氣益血暖下藏進飲食

澤蘭 赤石脂 牛膝 去苗酒浸切焙 人參 黃耆 剉各一兩

熟乾地黄 焙一兩半 白茯苓 去黑皮 木香 附子 炮裂去皮臍

草薢

續斷

桂去粗

芎藭

白朮

乾薑炮

當歸

剉炒

甘草

炙各半兩

右為末煉蜜和更杵五七百下丸如梧桐子大每服

空心食前溫粥飲下三十九日三一方用醋湯亦可

蜀椒丸

治產後虛羸月內不快顏色萎黃四肢無力

調補氣血

澤蘭葉

一兩

蕪荑仁

炒黃色

石膏

火

蜀椒

去目并合口者炒出汗

白芷

乾薑

此

藁本

去苗

厚朴

去粗皮生薑汁炙

人參

白朮

細辛

去苗葉 桂去粗皮

防風

去蘆

當歸

切炒

芍藥

栢子仁

炒令黃

甘草

炙赤各半兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大每服三十九溫酒或米

飲下不拘時候服

四順理中丸 治產後血氣俱傷五臟暴虛羸瘦少氣

多汗

甘草 人參 白朮 乾薑

各一兩

右為細末煉蜜丸如梧桐子大空心米飲下三十九

治產後羸瘦不能食益顏色進飲食方

肉豆蔻 桑寄生 黃橘皮 澤蘭 藿香 防風

木香 芎 甘草 石斛 五味子

各等分

右為細末每服一錢水一盞煎至九分空心喫

澤蘭丸 治產後諸疾愈後體中虛羸無力

澤蘭葉

炒一兩一分

黃耆

剉細一兩半

桑本

去苗土一兩

當歸

剉焙一兩半

白芷

一兩防風

去蘆一兩半

芍藥

一兩半

芎藭

一兩

麥門冬

去心焙二兩

桂

去粗皮三分

栢子仁

一兩

細辛

去苗葉半兩

熟乾地黄

焙一分

甘草

炙剉
一兩

石膏

研如麴
一兩三分

五味子

一兩

右搗研為細末煉蜜丸如梧桐子大空腹酒下二十

丸漸加至三十九日再服一方無芍藥

黃耆湯 治產後體虛力乏四肢羸瘦不思飲食

黃耆

熟乾地黄

焙

麥門冬

去心焙
各一兩

白朮

續斷

人參

茯神

去木

當歸

剉炒

五味子

白芍藥

赤石脂

陳橘皮

去白
焙

乾薑

炮各
半兩

附子

炮裂去皮
臍三分

桂

去粗皮
三分

甘草

炙一兩

右剉如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓溫服不拘時

五石丸 治產後虛羸寒熱四肢瘦弱不思飲食心神

虛煩夜卧不安

紫石英

一兩半 細研 水飛過

白石英

一兩半 細研 水飛過

鍾乳粉

一兩半

赤石脂

一兩半 細研

石膏

一兩半 細研 水飛過

五味子

一兩半 剉

黃耆

一兩半

麥門冬

一兩半 去心 焙

白茯苓

一兩半

白朮

一兩半 熟乾地黃

一兩半

甘草

半兩 炙 微赤剉

人參

去蘆 剉 微

當歸

剉 微炒

桂心

各一兩半

芎藭

各一兩半

右為末入研了藥都研令勻煉蜜和搗三百杵九
如梧桐子大每服以薤白湯下三十九日三服

熟乾地黄九 治產後虛羸瘦弱食少

熟地黄

一兩

當歸

半兩剉
微炒

附子

一兩炮裂
去皮臍

黃耆

一兩
剉

白朮

半兩

桂心

半兩

人參

三分去
蘆頭

赤石脂

一兩

栢子仁

一兩

麥門冬

一兩半
去心焙

白茯苓

三分

五味子

三分

續斷

半兩

芎藭

三分

肉蓯蓉

三分酒浸一宿刮
去粗皮炙令乾

右為末煉蜜和搗五七百杵九如梧桐子大每於空

心及晚食前以溫酒下三十丸

羚羊角散 治產後虛羸乏弱頭目昏悶不思飲食

羚羊角屑

三分

防風

半兩去蘆頭

附子

三分炮裂去皮臍

白朮

三分

人參

三分去蘆頭

石斛

三分去根剉

熟乾地黄

一兩

白茯苓

三分

陳橘皮

三分酒浸去白瓢炒

芎藭

三分

五味子

三分

甘草

一分炙微赤剉

桂心

三分黃耆

一兩剉

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚煎至六分去滓溫服日三服

五石湯 治產後虛冷七傷時寒熱體痛乏補腎并百病

紫石英 鍾乳 白石英 赤石脂 石膏 茯苓

白朮 桂心 芎藭 甘草 薤白 人參

各二兩 六兩 三兩

當歸

三兩 八兩 二十枚

生薑

二十枚

右五石並為末諸藥各咬咀以水一斗二升煮取三升六合去滓分六服若中風加葛根獨活各二兩下痢加龍骨一兩

麋骨湯 治產後虛乏五勞七傷虛損不足臟腑冷熱

不調

麋骨

一具

遠志

黃耆

芍藥

乾薑

防風

茯苓

一作茯神

厚朴

當歸

橘皮

甘草

獨活

芎藭

各二兩

桂心

生薑

各四兩

右㕮咀以水三斗煮麋骨取二斗去骨內藥煎取五

升去滓分五服

人參散 治產後虛羸脾胃之弱四肢無力全不思飲

食心腹脹滿

人參

黃耆

草果仁

一方作草且蔻

厚朴

附子

各一兩

白朮

當歸

白茯苓

木香

川芎

桂心

甘草

各半兩

陳皮

良薑

訶梨勒皮

各三分

右㕮咀每服四錢水一盞薑三片棗三枚煎至六分去滓無時溫服一方加白芍藥半兩

黃耆丸

療產後喘乏氣羸腹內絞痛自汗出

黃耆

人參

茯苓

甘草

白朮

五味子

芎藭

當歸

各六分

澤蘭葉

陳皮

各六分

麥門冬

訶子

各二分十分

桂心

熟乾地黃

各十分二分

右為細末煉蜜丸如梧桐子大空心溫酒下三四十

九日再服

防風丸 治產後勞損無子陰中冷溢出子門閉積年

不瘥身體寒冷

防風

一兩半

桔梗

三十粒

人參

一兩

菖蒲

半夏

丹砂

厚朴

乾薑

紫苑

杜蘅

各十八粒

秦朮

白飲

牛膝 沙參

各半兩

右為末白蜜和丸如小豆食後服十五丸日三服不知增至二十九有娠止夫不在勿服之服藥後七日

方合陰陽

熟乾地黄湯 治產後虛羸短氣不食

熟乾地黄

二兩人參

北五味子

石斛

白茯苓

白朮

鹿角膠

附子

各一兩

桂心

當歸

川芎

黃耆

澤蘭葉

續斷

各三分

右呶咀每服四錢薑棗依前煎服

澤蘭補虛丸 療婦人虛勞或本來虛寒或產後血脉

虛竭四肢羸弱飲食減少血脉斷絕不通

澤蘭葉九分石膏八分川芎 甘草 當歸各七分 白芷

防風 白朮 藁本 川椒 厚朴 乾薑 桂心

細辛各五分

右為細末煉蜜丸如梧桐子大酒下二三十丸日再
忌海藻松菜桃李生葱雀肉

鹿肉湯 治產後虛羸勞損補乏

鹿肉斤四 乾地黄 甘草 川芎 黃耆 麥門冬

芍藥 茯苓各三兩 人參 當歸 生薑各二兩

半夏升一 大棗二十枚

右咬咀先以水二斗五升煮肉取一斗三升去肉肉藥煎取五升去滓分四服日三夜一

羊腎湯 治產後虛羸乏力短氣

羊腎一雙去脂膜 麥門冬 羚羊角屑 北五味子 茯苓

桂心 續斷 黃耆 川芎 當歸 各半 附子 炮

人參 乾薑 熟乾地黃 一兩

右咬咀先以水二大盞煮腎至一盞去腎入藥五錢

椒二十七粒生薑三片棗三枚煎至五分去滓空心

溫服

大補益當歸丸

出千金方

治產後虛羸不足胸中少氣腹中

拘急疼痛或引腰背痛或所下過多血不止虛竭乏
氣晝夜不得眠及崩中面目脫色唇乾口燥亦治男

子傷絕或從高墮下內有所傷臟虛吐血及金瘡傷
犯皮肉

當歸 芎藭 續斷 乾薑 阿膠 甘草

各四兩

白米 吳茱萸 附子 白芷 乾地黃

各三兩

桂心 芍藥

各三兩

右為末煉蜜丸如梧桐子大酒服二十九日三夜一
不知加至十九若有真蒲黃加一升絕妙名大効內
補丸一方加杜仲鹿茸從蓉五味子

犀角飲子

出濟生
拔粹方

治產後亡津液虛損時自汗出發熱

困倦唇口乾燥

方見木門產後諸
瘡類犀角飲子

柴胡湯

治產後虛羸寒熱骨節疼痛四肢無力

柴胡

去苗

附子

炮裂去
皮臍

黃耆

秦艽

去苗土
各一兩

芍藥

三分

鱉甲

醋炙去
襖一兩

桂枝

去粗
皮

牡丹皮

白茯苓

去黑
皮

知母

焙

當歸

切

芍藥

炒

桃仁

去皮尖雙人
炒各三分

右判如麻豆每服三錢匕水一盞入生薑五片同煎

至七分去滓溫服不拘時

三石湯

出千金方

治產後虛冷七傷時寒熱體痛乏力補腎

并百病

紫石英

生薑

當歸

人參

甘草

各二兩

白石英

鍾乳

各二兩半

茯苓

乾地黄

桂心

各三兩

大棗

十五枚

半夏

五兩

右三石末呔咀諸藥以水一斗一升煮取三升去滓

分四服若中風加葛根四兩

加減吳茱萸湯

出和濟方

治婦人臍氣本虛宿挾風冷胸膈

滿痛腹脇絞刺嘔吐惡心飲食減少身面虛浮惡寒
戰慄或泄不止少氣羸困及因生產臟氣暴虛邪冷
內勝宿疾轉增

吳茱萸

一兩半

苦梗

乾薑

甘草

麥門冬

防風

赤茯苓

一作白茯苓

半夏

細辛

當歸

牡丹皮

桂心

各半兩

右為粗末每服四錢水一盞半煎至七分去滓食前

熱服

三分散

出濟生
拔粹方

治產後日久虛勞針灸下藥俱不効者

川芎 熟地黄 當歸 芍藥 白朮 茯苓

黃耆

各一兩

柴胡

人參

各一兩六錢

黃芩

半夏

甘草

各六錢

右為粗末水煎服清水一大盞煎至半盞去滓溫服

日二服

芍藥湯 治產後虛羸瘦瘁肌肉不澤氣血不充或寒

或熱

芍藥

一兩

五味子

一兩

芍藥

牡丹

去心

元參

當歸

切炒

人參

白茯苓

去黑皮

白薇

去苗

甘草

炙各三分一方用各半兩

麥門冬

去心微炒三分一方用一兩

生乾地黄

焙三分一方用乾地黄二兩

右粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗二枚擘

同煎至七分去滓溫服不拘時日三

續斷湯

出聖惠方

治產後虛羸不思飲食多卧少起

續斷

熟乾地黄

焙各一兩

羌活

去蘆頭

五味子

當歸

剉炒

芎藭

防風

去蘆

人參

黃耆

剉

酸棗仁

微炒各半兩

白茯苓

去黑皮三分

甘草

一分炙

右粗搗篩每服四錢匕水一盞入生薑半分棗二枚
擘破煎至六分去滓溫服日三服

大補中當歸湯

出千金方

治產後虛損不足腹中拘急或溺

血少腹苦痛或從高墮下傷犯於內兼治金瘡血
多肉傷然男子有證亦宜服之

當歸 續斷

桂心

芍藥

乾薑

麥門冬

各三兩

芍藥

四兩

白芷

二兩

甘草

二兩

吳茱萸

二升

乾地黄

六兩

大棗

四十枚

右咬咀以酒一斗漬藥一宿明旦以水一斗合煮取

五升去滓分五服日三夜二入黃耆一兩益佳

人參散

出聖惠方

治產後虛羸腑臟氣乏食飲不進宜服

人參

一兩去蘆頭

當歸

半兩剉微炒

五味子

黃耆

剉

芎藭

桂心

續斷

白茯苓

各三分

熟乾地黄

一兩

白朮

半兩

麥門冬

半兩去心

甘草

一分炙微赤剉

右為散每服四錢以水一中盞入生薑半分棗三枚

煎至六分去滓溫服日三服

羊肉當歸湯

出聖惠方

治產後虛羸乏弱無力喘急汗出腹

中疔痛不可忍

肥羊肉

介二當歸

白芍藥

各半兩

桂心

附子

炮川芎

黃耆

人參

龍骨

白朮

各三分

熟地黃

一兩

右為粗末先以水五大升煮羊肉取汁二大盞每服

四錢汁一中盞薑三片棗一枚煎至七分去滓溫服

日三服

當歸湯

治產後虛羸不足臟腑虛冷肢體疼痛時或

血露臍腹刺痛

當歸

切焙
兩半

芍藥

吳茱萸

湯淘去涎輕
炒各二兩

甘草

炙令赤
一兩

麥門冬

去心焙
一兩

生乾地黄

焙三
兩

白芷

一桂
皮去粗

續斷

芎藭

乾薑

炮裂各
一兩半

右粗搗篩每服三錢匕水一盞煎至七分去滓溫服

食前日二夜一

羊肉黃耆湯

出千
金方

治產後虛羸四肢瘦弱不能飲食

羊肉

五
斤

黃耆

一兩
半剉

白茯苓

一
兩

白芍藥

一
兩

當歸

一兩半
剉微炒

續斷

五味子

萆薢

剉

桂心

熟乾地黄

各一
兩

麥門冬

一兩半
去心焙

右為散用水一斗煮羊肉取汁五升每服用肉汁一中薑藥末四錢棗三枚生薑半分煎至六分去滓溫服日三服

當歸芍藥湯

出千金方

治產後虛損逆害飲食

當歸

一兩
剉

芍藥 人參 桂心 生薑 乾地黃

甘草

各一兩

大棗

二十枚

右㕮咀以水七升煮取三升去滓分三服日三

烏豆丸

出聖惠方

療產後羸乏復令肥白方

以大烏豆淨拭熬熟如造豆黃法去皮搗為末以

臘月豬脂成煉

右和丸如梧桐子大酒下五十丸日再一月內肥白

也無所忌

羊肉黃耆湯

出聖惠方

治產後虛乏補益

羊肉

三斤

黃耆

三兩

大棗

三十枚

茯苓

甘草

麥門冬

當歸

桂心

芍藥

乾地黄

各二兩

右呖咀以水二斗煮羊肉取汁一斗去肉內諸藥煎取三升去滓分三服日三一方用生薑煎服

當歸丸 治產後血氣不調日漸羸瘦身體肢節煩疼
面無顏色

當歸

切

生乾地黄

焙一方用熟

澤蘭

取葉各二兩

防風

去蘆黃耆剉

續斷

桂

去粗皮各一兩

人參

地骨皮

芍藥

各一兩半

右為末煉蜜為丸如梧桐子大每服二十九溫酒或米飲下不拘時

地黃湯

治產後虛羸寒熱往來補虛湯

方見本門
虛熱類

紫石英湯

治產後虛寒熱羸瘦

紫石英

別研
如粉

鍾乳粉

白石英

熟乾地黃

焙

當歸

切炒

半夏

生薑自然汁
製各半兩

桂

去粗
皮

白茯苓

去黑皮
各一兩

人參

甘草

炙各
三分

右粗搗篩每服三錢匕水一盞生薑三片棗一枚煎

七分去滓溫服不拘時

黃雌雞湯

出聖
惠方

治產後虛羸四肢無力不思飲食

肥黃雌雞

一隻去頭足翅羽及腸洗

當歸

一兩剉微炒

人參

三分去蘆頭

熟乾地黄

一兩半

桂心

半兩

甘草

一兩炙微赤剉

麥門冬

一兩半去心焙

芎藭

三分

白芍藥

三分

黃耆

一兩半剉

右為散先以水七升煮雞取汁三升每服用汁一中

盞入藥四錢煎至六分去滓溫服日三服

杏仁湯

出千金方

治產後虛氣

杏仁

橘皮

白前

人參

各三兩

蘇葉

半夏

各一升

桂心

四兩

生薑

十兩

麥門冬

二兩

右以水一斗二升煎取三升半去滓分五服

烏雞湯 治產後血氣衰弱日漸虛羸補不足

烏雌雞

一隻去翅羽腸足以水五升煎取汁三升

當歸

切焙炒

人參

甘草

炙

桂

去粗皮

芎藭

芍藥

剉

黃耆

麥門冬

去心炒各一兩

右除雞外粗搗篩每服三錢匕煎雞汁一盞生薑三

片棗一枚煎七分去滓溫服日三不拘時

三之一湯

出濟生拔粹方

治產後虛勞雖日久而脈盛浮疾

柴胡

八錢

黃芩

人參

半夏

洗

甘草

炙

熟地黃

川芎

芍藥

當歸

各三錢

右為粗末依小柴胡湯煎服如日久虛勞微有寒熱
脉沉而遲宜柴胡四物湯

芍藥湯

治產後虛勞骨節疼痛寒熱往來精神恍惚

夢寐驚悸

芍藥

牡丹皮

元參

芍藥

乾薑

炮

甘草

炙

白茯苓

去皮去黑

白薇

各二兩

麥門冬

去心焙

一兩半

右粗搗篩每服五錢匕以水二盞煎至一盞去滓放

溫服之日三

羊肉湯

出千金方

治產後虛羸困乏喘促自汗腹中絞痛

肥羊肉

三斤去脂

當歸

姚氏用
蔥白

芎藭

各三兩子母秘
錄作豉一升

桂心

甘草

各二兩

芍藥

子母秘錄
作蔥白

生薑

各四兩

乾地黄

五兩

右㕮咀以水一斗半先煮肉取七升去肉內餘藥煮

取三升去滓分三服不瘥重作一方加蔥白一斤子

母秘錄若胸中微熱加黃芩麥門冬各一兩頭痛加

石膏一兩中風加防風一兩大便秘不利加大黃一兩

小便難加葵子一兩上氣欬逆加五味子一兩一方

無當歸

羊肉地黄湯

出聖惠方

治產婦七日後宜服補虛羸強氣力

消滯血

方見本門腹痛類

乳蜜湯

出千金方

治產後七傷虛損少氣不足并腎勞寒冷

補氣

牛乳

七升無別用羊乳

白蜜

一升半

當歸

人參

獨活

各三兩

大棗

二十枚

甘草

桂心

各三兩

右呖咀藥以乳蜜中煮取三升去滓分四服

當歸湯 治產後虛勞骨節疼痛頭痛汗不出

當歸 人參

生薑

各二兩正
方用二分

黃耆

三兩

淡豉

五合

豬腎

一具粳米

薤白

三合

右水一斗五升先煮豬腎取六升後下諸藥煎至二升分為三服

羊肉湯 治產後排風補虛散血氣止痛

白羊肉

切一升

黃耆

剉

防風

剉去蘆

桂

剉去皮

當歸

切焙

芎藭

各半兩對

大棗

擘破七枚

生薑

切三分

右先以水五升煮羊肉取三升澄去脂後內諸藥煎取一升半去滓食前分溫四服如人行三五里再服

養氣活血丸

出楊氏家藏方

治產後諸虛不足勞傷血氣真元

內弱四肢倦怠肌肉消瘦及脾元虛損不入飲食或吐痢自汗或寒熱往來

大艾葉

炒焦取細末五兩

乾薑

炮取細末二兩半用好醋二升半無灰好酒

二升生薑自然汁一升將前薑艾末同調勻於銀器內慢火熬成膏

附子

炮去皮臍二兩

白芍藥

白朮

椒紅

當歸

洗焙

紫巴戟

大心糯米炒

人參

去蘆頭

川芎

五味子

八味各二兩

右件為細末入前膏子並炒熟白麪二兩半同和為劑入杵臼內搗千下九成如梧桐子大每服五十丸溫酒或米飲下食前

內補芎藭湯

出千金方

治婦人產後虛羸及崩傷過多虛渴

腹中絞痛

芎藭

四兩

乾地黄

四兩

芍藥

五兩

桂心

二兩

甘草

三兩

乾薑

三兩

大棗

四十枚

右㕮咀以水一斗二升煮取三升去滓分三服日三
不瘥復作至三劑若有寒苦癥瘕附子三兩旋加治
婦人虛羸少氣傷絕腹中拘痛及崩傷虛竭面目無
色及唾血甚良

進食散

出大金
良方

治脾胃虛寒不思飲食及久病人脾胃

虛全不入食者只兩服能食

青皮 陳皮 粉草 良薑

桂心 各一兩 川烏

炮去
皮尖

草豆蔻仁

各三筒

訶子

五筒

右為細末每服一錢水一盞薑三片煎至七分溫服此方既有川烏治血風攻脾不食豈無驗

人參湯

出便產須知方

療產後多虛羸弱若大汗利皆至於死

此重虛故也所以苦中風謬誤昏悶不省人事

人參

茯苓

菴活

桂心

大棗

遠志

各十分

竹瀝

一升

右用水六升煮取三升下竹瀝更煎取二升溫分三

服

增損柴胡湯

出濟生
拔粹方

治產後虛羸發寒熱飲食少腹脹

北柴胡 人參 甘草 半夏 陳皮 川芎

白芍藥

右各等分㕮咀每服三錢水一大盞薑五片棗二枚
煎七分去滓食後溫服日二服 如產後風氣在表
面目四肢浮宜局方中七聖丸白湯下之以利為度
如浮腫添喘嗽加木香檳榔倍之謂氣多也 如

浮腫加頭痛昏冒加羌活川芎謂風多也 如只浮腫依七聖丸本方服之

芍藥湯 療產後虛乏不思飲食四肢皆倦心腹陣痛
補虛治氣

人參 芍藥 桂心 甘草 生薑 各一兩 當歸 一兩半

生地黃 二兩

右以咀每服三錢水二盞棗二枚煎至一盞去滓溫服日三服

人參湯 治產後虛羸困乏肌肉不生血脉不榮

人參 芎藭 黃耆 甘草 炙令黃 桂 去粗皮
各二兩

生乾地黄 焙用 乾薑 炮裂
二兩 半兩

右粗搗篩每服三錢匕用煮羊肉汁一盞煎七分去

滓溫服不拘時

氣補湯

出肘後方

治產後大虛勞

黃雄雞一隻 赤小豆 五升大 乾地黄 兩 甘草 桂心

黃芩 芍藥 各二兩

右以水二斗煮雞豆一斗去滓內藥煎取四升分為四服

風濕湯 治婦人產後血氣虛損傷風寒濕口急項強腰脚疼痛

烏頭

此去皮一兩

當歸

芍藥

麻黃

去節

甘草

炒

白朮

各半兩

右㕮咀每服三錢水一盞半生薑四片煎至七分去滓溫服不拘時

黃雌雞湯

黃雌雞

一隻去頭足翅羽腸肚細切

當歸

白朮

熟地黃

桂心

黃耆

各半兩

右咬咀以水七升煮雞至三升每服藥四錢以雞汁一盞煎至六分去滓溫服日三服

內補當歸建中湯

出三因方

治產後虛羸不足腹中疴痛不

止吸吸少氣或若小腹拘急痛引腰背不能飲食產

後一月內得服四五劑為善令人力壯及治婦人一

切血氣虛損時自汗出

當歸

四兩

芍藥

五兩

甘草

二兩

生薑

六兩

桂心

三兩

大棗

十八枚

右㕮咀以水一斗煮取三升去滓分服一日令盡若大虛內飴糖六兩作湯成內之於火上飴消若無生薑則以乾薑三兩代之若其人去血過多崩傷內竭不止加地黃六兩阿膠二兩合八種作湯或去滓內阿膠若無當歸以芎藭代之

甘草九

治產後虛損主補虛去血止痛

甘草

炙五兩

當歸

乾薑

人參

白朮

各二兩

右搗篩蜜丸如彈子磨內一升酒中作一服日三

治產後虛羸盜汗時暈惡寒

以吳茱萸三兩以清酒三升漬一宿煮如蟻鼻沸
減得二升許中分之頓服一升日再間日再作服
亦治產後腹中疼痛

羊肉方 治產後大虛羸瘦無力腹肚痛冷氣不調又
腦中風汗自出

以白羊肉一斤如常法調和臠腊食之

當歸湯

治婦人寒疝虛勞不足若產後腹中絞痛並

治之

方見本門
腹痛類

豬膏煎

出千
金方

治產後體虛寒熱自汗出者

豬膏

生薑汁

白蜜

各一
升

清酒

五
合

右當炭火上熬令調和五上五下膏成隨意酒服方寸匕

地黃羊脂煎

出千
金方

療產後諸病羸瘦欲肥白

生地黃

一
升

生薑汁

五
升

羊脂

二
斤

白蜜

五
升

右先煎地黃汁令餘五升下羊脂煎減半次下薑次

下蜜便以銅器盛著湯中煎令如飴狀空肚酒一升
取煎如雞子大投酒中飲日三良

療產後虛羸困乏

黃雌雞

一隻去毛
背上破

生百合

煨三枚

白粳米

半升

右依常法著五味調和縫雞背合味汁煮熟開腹取
百合并相和汁作羹食之內亦食令盡略卧佳

當歸散

出神効方

治婦人產後虛弱和血通經

當歸

一兩
焙

芍藥

二兩
炒

香附子

右為細末每服一二錢米飲湯調下服之無時

枳實散

出肘後方

治產後虛損煩亂不得眠

枳實

芍藥

等分炙

右為末服方寸匕日三服之

二聖散 治產後虛羸汗不止煩倦少力

麻黃根

二兩

故敗扇

燒取灰秤半兩

右為散每服二錢匕煎人參湯調不拘時

羊腎方

出肘後方

猪腎

一具 羊腎 一具

右以葱豉作臠食如常

治產後虛勞骨節疼痛汗出不止

出本草

取猪腎造柿臠以葱豉米如法食之

治婦人產後虛損

以蛭食之

普濟方卷三百五十二